

核准日期：2007年02月15日
修改日期：2024年12月27日



舒胸颗粒说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

- 【药品名称】通用名称：舒胸颗粒
汉语拼音：Shuxiong Keli
- 【成份】三七、红花、川芎。
- 【性状】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味苦。
- 【功能主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
- 【规格】每袋装1g
- 【用法用量】口服。一次1袋，一日3次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见恶心、呕吐、上腹痛、瘙痒等不良反应。
- 【禁忌】1. 孕妇禁用。
2. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】1. 热证所致瘀血忌用。
2. 忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌烟酒、浓茶。
3. 治疗期间，如心绞痛持续发作，或出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。
4. 月经期妇女慎用。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】药用复合膜袋，每盒10袋。
- 【有效期】24个月
- 【执行标准】《中国药典》2020年版一部
- 【批准文号】国药准字Z10980160
- 【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司
地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
- 【生产企业】成都迪康药业股份有限公司
生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
邮政编码：611731
电话号码：4006607322
传真号码：028-87845888
注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
E-mail: dky@dikangyaoye.com

核准日期：2007年02月15日
修改日期：2024年12月27日



舒胸颗粒说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

- 【药品名称】通用名称：舒胸颗粒
汉语拼音：Shuxiong Keli
- 【成份】三七、红花、川芎。
- 【性状】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味苦。
- 【功能主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
- 【规格】每袋装1g
- 【用法用量】口服。一次1袋，一日3次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见恶心、呕吐、上腹痛、瘙痒等不良反应。
- 【禁忌】1. 孕妇禁用。
2. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】1. 热证所致瘀血忌用。
2. 忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌烟酒、浓茶。
3. 治疗期间，如心绞痛持续发作，或出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。
4. 月经期妇女慎用。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】药用复合膜袋，每盒9袋。
- 【有效期】24个月
- 【执行标准】《中国药典》2020年版一部
- 【批准文号】国药准字Z10980160
- 【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司
地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
- 【生产企业】成都迪康药业股份有限公司
生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
邮政编码：611731
电话号码：4006607322
销售电话：400-181-8000
传真号码：028-87845888
注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

核准日期：2007年02月15日
修改日期：2024年12月27日

修正集团

舒胸颗粒说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

- 【药品名称】通用名称：舒胸颗粒
汉语拼音：Shuxiong Keli
- 【成份】三七、红花、川芎。
- 【性状】本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味苦。
- 【功能主治】活血化痰，通络止痛。用于瘀血阻滞所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
- 【规格】每袋装1g
- 【用法用量】口服。一次1袋，一日3次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见恶心、呕吐、上腹痛、瘙痒等不良反应。
- 【禁忌】1. 孕妇禁用。
2. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】1. 热证所致瘀血忌用。
2. 忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌烟酒、浓茶。
3. 治疗期间，如心绞痛持续发作，或出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。
4. 月经期妇女慎用。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】药用复合膜袋，每盒8袋。
- 【有效期】24个月
- 【执行标准】《中国药典》2020年版一部
- 【批准文号】国药准字Z10980160
- 【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司
地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
- 【生产企业】成都迪康药业股份有限公司
生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
邮政编码：611731
电话号码：4006607322
传真号码：028-87845888
注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

